

El conjunto de lagunas de alta montaña del Sistema Ibérico tiene un gran valor como uno de los pocos casos de morfología glaciar en el interior peninsular.

| | CODIGO CATALOGO | CODIGO MOP/MA | CODIGO | NOMBRE | OTROS NOMBRES | PROVINCIA | MUNICIPIO | CUENCA | SUBCUENCA | FECHA CATALOGACION | FIGURAS DE PROTECCION | SITUACION | MAPA IGN | LONGITUD | LATITUD | MAPA IGE | COORD. UTM | TIPO | NATURALIDAD | ESTADO DE CONSERVACION | TEMPORALIDAD | UNIDADES | SUPERFICIE | ALTITUD | PERIMETRO | SALINIDAD | INFORMACION BIOLÓGICA | OBSERVACIONES | BIBLIOGRAFÍA |
|------------------|-----------------|------------------------|--------|------------------|----------------------|-----------|--------------------|--------|----------------|--------------------|---|--|----------|---------------|---------------|----------|-------------|---------|-------------|------------------------|--------------|----------|------------|-------------|-----------|-----------|---|---|--|
| LAGUNA NEGRA | CDD-03 | 02 CL 20101 SO 0317001 | SO-02 | LAGUNA NEGRA | LAGUNAS DE ZORRAQUÍN | SORIA | VINUESA | DUERO | RÍO REVINUESA | 25/08/94 | PARQUE NATURAL SIERRA DE URIBÓN. ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LA C.H.D. | AL NORTE DEL T.M. VERTIENTE SUR DEL RISCO ZORRAQUÍN. | 22-13 | 02° 51' 00" W | 42° 00' 05" N | 317 | 30TWM127499 | GLACIAR | NATURAL | CONSERVADA | PERMANENTE | 1 | 3,24 ha | 1740 m.s.n. | 0,719 km | DULCE | Trucha común y arco-iría (hoplostetión). Zona montañesa con Pinus equinata. Hábitat por sus pendientes de Canes (Cedón lasca). Ombra periódicamente inundada con vegetación efímera (Lobelia uniflora, Anemone nemorosa). Babelero. | Lago de alta montaña originado por erosión glaciar de tipo "circo". La cubeta se forma en la zona de contacto geológico. Creada por Pardo (1948). Es la laguna más baja y sencilla la más importante del grupo soriano (vertiente sur) de lagunas glaciares de los Picos de Urbión, que contribuye a la mejor manifestación de geomorfología glaciar del Sistema Ibérico. | Pardo (1948) nº 1554 |
| LAGUNA HELADA | CDD-02 | 02 CL 20101 SO 0316001 | SO-05 | LAGUNA HELADA | LAGUNAS DE ZORRAQUÍN | SORIA | COVALEDA | DUERO | RÍO REVINUESA | 25/08/94 | PARQUE NATURAL SIERRA DE URIBÓN. ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LA C.H.D. | URIBÓN 8,8 km AL NORTE DE COVALEDA | 21-13 | 02° 51' 35" W | 41° 59' 46" N | 316 | 30TWM117493 | GLACIAR | NATURAL | CONSERVADA | PERMANENTE | 1 | 5,14 ha | 2000 m.s.n. | 1,112 km | DULCE | A veces se ha observado anélidos marinos y otras invertebradas. Aguas descalcadas de fauna superior. Babelero de pajales, corchos y carras. | Humedal de alta montaña originado por erosión glaciar de tipo "circo". Laguna del grupo soriano (vertiente sur) de lagunas glaciares de los Picos de Urbión, que contribuye a la mejor manifestación de geomorfología glaciar del Sistema Ibérico. | Pardo (1948) nº 1025 |
| LAGUNA LARGA | CDD-01 | 02 CL 20101 SO 0278017 | SO-01 | LAGUNA LARGA | LAGUNAS DE ZORRAQUÍN | SORIA | COVALEDA | DUERO | RÍO REVINUESA | 25/08/94 | PARQUE NATURAL SIERRA DE URIBÓN. ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LA C.H.D. | EN LA VERTIENTE SE DEL PICCO DE URIBÓN | | 02° 52' 00" W | 42° 00' 25" N | 278 | 30TWM111506 | GLACIAR | NATURAL | CONSERVADA | PERMANENTE | 1 | 1,02 ha | 2000 m.s.n. | 0,486 km | DULCE | Sin vegetación palustre. Aguas descalcadas de fauna superior. No contribuye a la mejor manifestación de geomorfología glaciar del Sistema Ibérico. | Humedal de alta montaña originado por erosión glaciar de tipo "circo". Pequeña laguna soriana. La más alta del grupo soriano (vertiente sur) de lagunas glaciares de los Picos de Urbión, que contribuye a la mejor manifestación de geomorfología glaciar del Sistema Ibérico. | Pardo (1948) nº 1231. Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, 1976. |
| LAGUNA CEBOLLERA | CDD-04 | 02 CL 20103 SO 0317006 | SO-11 | LAGUNA CEBOLLERA | CEBOLLERA | SORIA | SÓTILLO DEL RINCÓN | DUERO | RÍO RAZONCILLO | 25/08/94 | PARQUE NATURAL SIERRA DE URIBÓN. ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LA C.H.D. | EN EL EXTREMO N DEL RINCÓN | 22-13 | 02° 39' 05" W | 41° 59' 50" N | 317 | 30TWM298497 | GLACIAR | NATURAL | ALTERADA | PERMANENTE | 1 | 7,41 ha | 1840 m.s.n. | 1,353 km | DULCE | Sin vegetación palustre. Vegetación sumergida con abundancia de Sium sp. Áreas acuosas de pascos (áreas reales). Trucha común. Babelero de corchos, corchos y pajales. | Humedal de alta montaña originado por erosión glaciar tipo "romera". Pertenencia al grupo soriano (vertiente sur) de lagunas glaciares del Sistema Ibérico, pero situada de los Picos de Urbión, siendo la única importante de la Sierra de Cazorla. Está reservada. | Pardo (1946) nº 524. Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, 1976. |